



## **Ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia czynnika zakaźnego do stada:**

- surowce i mieszanki są chronione przed dostępem dzikich zwierząt,
- na wlotach powietrza i oknach jest założona siatka ochronna,
- koty i psy nie wchodzą do chlewni ani paszarni,
- środki transportu nie wjeżdżają do gospodarstwa, jeśli to konieczne przejeżdżają przez basen/matę dezynfekcyjną,
- gryzonie roznoszą choroby, więc należy regularnie deratyzować chlewnię,
- dziki nie mają dostępu do gospodarstwa, są nosicielami ASF,
- słomę składa się w miejscu niedostępnym dla dzików, uwaga na pola pod lasem,
- osoby wchodzące do chlewni zawsze zmieniają odzież wierzchnią oraz obuwie,
- sprzęt wykorzystywany do produkcji świń służy tylko w jednym gospodarstwie,
- lekarz weterynarii wchodząc do chlewni przestrzega kwarantanny,
- do chlewni nie wnosi się wyrobów z dziczyzny,
- obsługa nie hoduje własnych świń oraz przestrzega zasad bioasekuracji,
- świnię wprowadzoną do chlewni mają udokumentowany status zdrowotny,
- myśliwi nie mają kontaktu z trzodą chlewną.